

常見用藥



藥劑部藥師 梁芯瑜

Q 醫師開給我「遠疼貼貼片」，這個貼片應該如何使用呢？有什麼需要注意的？

A 院內的遠疼貼貼片(Lidopat) 每片內含 5% 的 lidocaine，這是一種局部麻醉劑，可以穿透未受損傷的皮膚產生止痛效果。

作用原理

Lidocaine 成分擴散至皮膚，直接作用在局部的神經末梢，減少疼痛訊號的傳遞，進而達到止痛的效果。

適應症：衛福部核可用於緩解皰疹後神經痛（Post-herpetic neuralgia）。但醫師可能會因為您的病情需要而開立此款貼片用於止痛。

使用方法與劑量

1. 請遵照醫師的處方劑量使用。原則上每 24 小時用一次，每次最多可使用 3 片，每次使用不超過 12 小時。移除貼片後至少休息 12 小時才可再次使用。
2. 移除封套後，請使用於疼痛部位的完整未受損無傷口之皮膚上，衣服可以覆蓋在貼片之上，但不建議熱敷或接觸電毯。移除封套前可根據使用需求將貼片剪為小片使用。
3. 如果在使用期間如果有刺痛或者灼熱感，請移除貼片等待疼痛感消失。

副作用

1. 遠疼貼貼片造成的局部不良反應，一般說來是溫和的，且會在撕下貼片數分鐘到數小時內消失；治療部位的皮膚可能會發生紅斑、水腫、瘀血、丘疹、小水泡、變色、色素消退、灼熱感、搔癢、皮膚炎、瘀斑、水疱、剝離或局部知覺異常。
2. 使用 lidocaine 有關的過敏及類過敏性反應，雖然罕見，但可能發生，如蕁麻疹、血管水腫、支氣管痙攣、喉頭痙攣、呼吸困難、休克；如果發生以上嚴重副作用，請立即就醫。