## 醫事人員





### 邱士庭 醫師

### 現職

• 臺大醫院泌尿部主治醫師

### 事長

攝護腺肥大、攝護腺癌症、尿路結石

### 學歷

• 國立臺灣大學醫學系醫學士

### 經歷

- 輔大醫院泌尿科主治醫師
- 臺大醫院泌尿部總醫師
- 臺大醫院泌尿部住院醫師



門診時間

### 邱醫師貼心小叮嚀

攝護腺肥大是男性常見的健康 問題,尤其隨年齡增長更為普遍。建 議培養運動習慣,維持健康體重,並 避免長時間久坐。飲食方面,應多攝 取富含纖維的食物,如新鮮蔬果和全 穀類,並減少攝取高脂、高糖食物。 若有頻尿症狀,減少咖啡因和酒精攝 取有助減少尿路刺激。

攝護腺肥大常見症狀包括頻 尿、急尿、夜尿、排尿困難及尿流變 弱,若出現以上症狀,建議及早諮詢 醫師,安排檢查,及早治療,除了能 減少不適、改善生活品質,也能維護 泌尿道的機能喔!







# 醫事人員





## 蘇乾嘉 醫師

### 現職

• 臺大醫院眼科部主治醫師

### 專長

青光眼、低視能

### 學歷

- 國立臺灣大學醫學院臨床醫學研究 所博士
- 國立臺灣大學醫學院臨床醫學研究 所碩士
- 中國醫藥大學醫學院醫學系醫學士

#### 經歷

- 國立臺灣大學醫學院眼科臨床助理 教授
- 美國杜克大學眼科青光眼臨床研究 員與博士後研究
- 美國密西根大學眼科低視能臨床研究員
- 新竹臺大分院眼科主治醫師





### 蘇醫師貼心小叮嚀

青光眼通常無明顯症狀(但急性青光眼,可能出現頭痛或噁心), 多數患者早期雖無感,但視野已從外圍開始缺損,直到晚期受損嚴重才發現。故即使眼壓正常,也可能 有青光眼,因此需要定期進行。 電光眼可通過點眼藥控制,但若 是不佳或副作用嚴重,可能需雷射 或手術。治療目的是延緩病情進 展,防止視力惡化。定期檢查對於 高風險族群尤其重要,以早期發現 並預防視神經損傷。

