道攝護腺雷射手術和新型低侵入性微創治療,包括:攝護腺水蒸氣熱力治療(Rezun)、經尿道植入臨時支架裝置(iTind)、前列腺水刀消融術(Aquablation)、經尿道前列腺拉開術(UroLift)。

# 如何保養

- 1.五十歲以上的男人應該定期體險,瞭解攝護腺的情況。
- 2.避免憋尿。
- 3. 可有正常的性生活,不要禁慾(避免攝護腺充血)。
- 4. 有小便困難時,一定要求醫診治。
- 5. 飲食理均衡,多食穀類、堅果、 生鮮蔬果與黃豆及黃豆製品。
- 6. 減少飲食中的脂肪-拒絕紅肉。
- 7. 減少刺激性食物的攝取,如咖啡因、辛辣與酒。
- 8. 睡前避免飲用大量含制尿成份的飲料,如咖啡、茶或啤酒。

攝護腺肥大是男性老化的過程 之一,所有的男性朋友都應該 學著與其和平共存



#### 一、開放時間:

週一至週五 08:00 至 17:00 (例假日不開放)

#### 二、聯絡方式

1. 地址:10002臺北市常德街一號一樓(台大醫院西址二東)

2. 諮詢專線: (02) 2356-2114





# 『良性』 攝護腺肥大



以尿部 姜宜妮醫師 2023.12 審訂

攝護腺又名『前列腺』,成年男性的攝護腺約腰果大小,重量約20公克,主要功能是分泌和儲存前列腺液。隨著年齡的增長,攝護腺會出現良性增生變化,此為老化的正常現象,稱為『良性攝護腺肥大』。

# 攝護腺肥大會變成攝護腺癌嗎?

目前並沒有定論,但是如果已經產生了良性攝護腺肥大者,也可能同時罹患攝護腺癌,而且兩者顯示出的症狀非常相似。因此,50歲以上的男性,無論如何一定要定期檢查攝護腺的健康狀況,以免延誤治療。

## 攝護腺肥大的症狀

- 小便時必須等待一陣子才能解得出來, 有時甚至等一兩分鐘還解不出來。
- 尿流變細且微弱無力,有時會中 斷,分好幾次才能解完。
- ●解完小便後,總還滴滴答答的留下一些無法解乾淨的餘尿。
- ●膀胱脹滿後,尿液無法控制或不知 覺的流出。
- ●老是覺得膀胱裡的尿液沒有排完, 小便後仍覺尿急。

●排尿次數增加,尤其是晚上必須起床好幾次去小便。

攝護腺肥大要做哪些檢查

#### 1.肛門指診:

40 歲以上男性每年應作一次肛門 指診。

## 2.血液篩險(PSA):

抽血檢重即可,不需空腹,其正常 值隨年齡增長而升高(參考數據如 下)。

年齡	參考值
40-49 歲	< 2.5 ng/mL
50-59 歲	< 3.5 ng/mL
60-69 歲	< 4.5 ng/mL
70-79 歲	< 6.5 ng/mL

## ●造成 PSA 升高之因素:

良性攝護腺肥大、攝護腺癌、攝 護腺發灸、攝護腺按摩、急性尿滯留 或放置導尿管、騎乘腳踏車、經直腸 攝護腺超音波等。

# 攝護腺肥大的治療方式

#### 1. 觀察

如果排尿功能正常且餘尿不多,沒 有尿路發炎,就無須治療。但需每 半年到一年追縱,觀察攝護腺肥大 的進展狀態。

#### 2.藥物治療

- (1)使尿道放鬆的藥-甲型交感神經阳斷劑
  - A. 可將攝護腺尿道緊繃的肌 肉鬆弛,改善排尿困難的 症狀。
  - B. 不能縮小肥大的攝護腺。
  - C. 少數人可能會有頭暈目眩 的副作用,需注意血壓的 變化。
- (2)使攝護腺縮小的藥-男性荷爾蒙抑制劑
  - A. 這腫藥物的原理是將攝護 腺縮小,但會產生性慾減 退的副作用。
  - B. 副作用在停藥後就會恢 復,但攝護腺又會因停藥 而再度發生肥大。
  - C. 在使用這種藥物時,最好 與醫師及妻子商量後再決 定。

#### 3. 手術治療

手術方式有:傳統開腹式攝護腺 切除手術(已相當少見)、經尿 道攝護腺刮除術(電刀)、經尿